

# 中風遲發性出血 初期症狀不顯不易防

台灣新生報 作者：【記者李叔霖／台北報導】 | 台灣新生報 - 2013年12月30日 上午12:00

中風遲發性出血可說是一種重症，也常常令患者防不勝防。中西醫師廖桂聲表示，這種病症常會發生在老人家身上，尤其是不慎意外撞傷頭部的老年人，由於在第一時間沒有察覺到腦出血或腦部不適的症狀，以致於過約兩個禮拜後才明顯出現症狀，這時候患者已逐步面臨死亡的威脅。

廖醫師指出，新聞經常報導老人家被撞後感覺沒事，結果回家後過一段日子卻死掉的憾事，這可能就是中風遲發性出血惹的禍！因為是慢慢地出血，就如同水龍頭緩慢地滴水一般，所以當事人在意外事故發生現場常感覺無大礙，等到出血愈來愈多時早已晚了一步。

等到患者出現明顯症狀時，常有頭暈、視物模糊、眼睛無法閉合、同側手腳無力、手抬不起來、嘴巴或臉部表情不正常等症狀，每個患者的症狀可能不太一樣，主要視患處而定，通常多半是壓迫到神經才會出現症狀。

廖桂聲醫師指出，原則上經西醫治療一段時間，病情已穩定後，中醫療法可以介入進行後續修補療程，通常會使用血府逐瘀湯、天麻鉤藤飲等中藥方，以便降低腦壓、促進血液循環，同時配合使用頭皮針，可望刺激醒腦、活化腦部神經。






圖 1：頭皮針。  
圖片提供／廖桂聲醫師